



PZN-0299016

Vinceel®

Spray voor oromucosaal gebruik

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 48 uren niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Vinceel spray voor oromucosaal gebruik en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Vinceel spray voor oromucosaal gebruik gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Vinceel spray voor oromucosaal gebruik?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vinceel spray voor oromucosaal gebruik?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Vinceel spray voor oromucosaal gebruik en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vinceel is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel gebruikt voor de behandeling van symptomen ten gevolge van ontstekingen van het mond- en keelslijmvlies, en voor de verlichting van keelpijn, heesheid, pijn in de mond en aftan.

Wordt uw klacht na 48 uren niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u Vinceel spray voor oromucosaal gebruik niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- Bij allergie (overgevoeligheid) voor één van de werkzame bestanddelen of hulpstoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij overgevoeligheid voor planten van de Compositiefamilie (Asteraceae) of voor bijengif.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis.

Dit geneesmiddel bevat ethanol en mag niet worden geïnhaleerd. Het gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar wordt niet aanbevolen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Vinceel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Tot op heden zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn van Vinceel geen gegevens beschikbaar over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, gezien de homeopathische verdundingen van de bestanddelen van dit geneesmiddel tot dusver niet toxisch zijn gebleken. Voor zover bekend kan Vinceel gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend die er op wijzen dat Vinceel invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Vinceel bevat ethanol

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis.

3. Hoe gebruikt u Vinceel spray voor oromucosaal gebruik?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering voor volwassenen:

De aanbevolen dosering is 1 verstuiving, 3 tot 5 maal daags. Bij acute klachten, 1 verstuiving om het ½ uur tot 1 uur en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 12 verstuivingen daags).

Dosering voor kinderen:

Kinderen en adolescenten van 2 tot 18 jaar:

De aanbevolen dosering is 1 verstuiving, 3 tot 5 maal daags. Bij acute klachten, 1 verstuiving om het ½ uur tot 1 uur en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 12 verstuivingen daags).

Notice: Information de l'utilisateur

Vinceel®

Solution pour pulvérisation buccale

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous sentez moins bien après 48 heures.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Vinceel solution pour pulvérisation buccale et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Vinceel solution pour pulvérisation buccale ?
3. Comment utiliser Vinceel solution pour pulvérisation buccale?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Vinceel solution pour pulvérisation buccale?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Vinceel solution pour pulvérisation buccale et dans quel cas est-il utilisé?

Vinceel est un médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés pour le traitement des symptômes causés par une inflammation de la muqueuse bucco-pharyngée et pour le soulagement des maux de gorge, de l'enrouement, des douleurs buccales et des aphtes.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous sentez moins bien après 48 heures.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Vinceel solution pour pulvérisation buccale ?

N'utilisez jamais Vinceel solution pour pulvérisation buccale

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux principes actifs ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 4.
- Si vous êtes allergique aux plantes de la famille des composées (Asteracées) ou au venin d'abeille.

Avertissements et précautions



Draai het sprayarmpje in horizontale stand. Vóór het eerste gebruik, het pompje verschillende malen indrukken tot een fijne nevel wordt verspreid. Plaats de wijsvinger op de kop van het doseerpompje. Breng het sprayarmpje in de mond, richt op het te behandelen gebied en verstuif. Houd hierbij het flesje bij voorkeur in verticale positie. Kinderen van 2 tot 11 jaar moeten begeleid worden, om te voorkomen dat zij de verstuiving inhaleren tijdens het vernevelen. Om hygiënische redenen is het aangeraden hetzelfde product niet met anderen te delen.

Heeft u teveel van Vinceel gebruikt?

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verduunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Vinceel heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer er meer Vinceel werd gebruikt dan strikt noodzakelijk is, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten. Wanneer u toch nog vragen heeft, contacteer uw apotheker, arts of het Antigifcentrum (070 245 245).

Bent u vergeten Vinceel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Vinceel

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In zeldzame gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties of lokale allergische reacties (huidontsteking, roodheid, zwelling en pruritus) optreden. In dit geval dient de behandeling te worden stopgezet.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Vinceel spray voor oromucosaal gebruik?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Vinceel?

De werkzame bestanddelen van 100 g oplossing zijn: Apis mellifica D7, Belladonna D5, Calendula officinalis D3, Echinacea purpurea D5, Phytolacca decandra D3, Plantago major D3, Salvia officinalis D3, Vincetoxicum officinale D5 à 1,25 g. De andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn: Ethanolum, Aqua purificata, Glycerolum.

Hoe ziet Vinceel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Spray voor oromucosaal gebruik.
Flesje van 20 ml met doseerpompje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium nv
B-9031 Drogen (Gent)
Tel.: 09/265 95 65
Fax: 09/223 00 76
E-mail: info@heel.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

982 CH 689 F11

Afleveringswijze

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2015.

PZN-0299016



Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose.

Ce médicament contient de l'éthanol et ne peut être inhalé. L'utilisation chez les enfants de moins de 2 ans n'est pas recommandée.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Vinceel solution pour pulvérisation buccale.

Autres médicaments et Vinceel

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. Jusqu'à présent il n'y a pas d'interactions connues avec d'autres médicaments.

Vinceel avec des aliments et boissons

Pour autant que l'on sache, ce médicament peut être pris en association avec des aliments et des boissons.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il n'existe pas de données concernant l'effet de Vinceel sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement. Aucun effet sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement n'est attendu dans la mesure où les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne présentent aucune toxicité connue. Pour autant que l'on sache, Vinceel peut être utilisé selon la posologie indiquée au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'existe pas de données indiquant que Vinceel puisse altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

Vinceel contient de l'éthanol

Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose.

3. Comment utiliser Vinceel solution pour pulvérisation buccale?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.


Posologie pour adultes :

La dose recommandée est de 1 pulvérisation, 3 à 5 fois par jour. Dans les conditions aiguës, 1 pulvérisation toutes les ½ à 1 heure, puis passer à la dose habituelle (maximum 12 pulvérisations par jour).

Posologie pour population pédiatrique :

Enfants et adolescents de 2 à 18 ans :

La dose recommandée est de 1 pulvérisation, 3 à 5 fois par jour. Dans les conditions aiguës, 1 pulvérisation toutes les ½ à 1 heure, puis passer à la dose habituelle (maximum 12 pulvérisations par jour).



Placez l'applicateur en position horizontale. Avant la première utilisation, appuyez à plusieurs reprises sur le pulvérisateur jusqu'à ce qu'une fine brume apparaisse. Posez l'index sur le dessus du pulvérisateur. Orientez l'applicateur dans la bouche vers la zone à traiter et pulvérisez. Tenez toujours le flacon en position verticale. Les enfants âgés de 2 à 11 ans doivent être surveillés pour éviter qu'ils inhalent la pulvérisation. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de ne pas partager le même pulvérisateur avec d'autres personnes.

Si vous avez utilisé plus de Vincerel que vous n'auriez dû
Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous avez utilisé plus de Vincerel que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort. Si vous avez utilisé plus de Vincerel que nécessaire, il n'y a pas d'effets secondaires à prévoir. Si vous avez encore des questions, contactez votre pharmacien, votre médecin ou le Centre Antipoisons (070/ 245 245).

Si vous avez oublié d'utiliser Vincerel
N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous arrêtez d'utiliser Vincerel
L'arrêt du traitement n'entraîne pas d'effets particuliers. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité ou des réactions allergiques locales (inflammation de la peau, rougeurs, enflure et prurit) peuvent survenir. Dans ce cas, le traitement doit être arrêté.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Vincerel®

Spray zur Anwendung in der Mundhöhle

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

- Wenn Sie sich nach 48 Stunden nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Vincerel Spray zur Anwendung in der Mundhöhle und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Vincerel Spray zur Anwendung in der Mundhöhle beachten?
3. Wie ist Vincerel Spray zur Anwendung in der Mundhöhle anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Vincerel Spray zur Anwendung in der Mundhöhle aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Vincerel Spray zur Anwendung in der Mundhöhle und wofür wird es angewendet?

Vincerel ist ein homöopathisches Arzneimittel mit Bestandteilen, die traditionell zur Behandlung von Symptomen, die sich aus Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhäute ergeben, sowie zur Linderung von Halsschmerzen, Heiserkeit, Schmerzen im Mund und Aphthen angewendet werden.

Wenn Sie sich nach 48 Stunden nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Spray zur Anwendung in der Mundhöhle Vincerel beachten?

Vincerel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen einen der in Abschnitt 6. genannten Wirk- oder Hilfsstoffe dieses Arzneimittels sind.

- wenn Sie allergisch gegen Pflanzen der Asteraceae (Compositae) Familie oder gegen Biengift sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Arzneimittel enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol), weniger als 100 mg pro Dosis.

Dieses Produkt enthält Ethanol und sollte nicht inhaled werden. Es ist nicht für Kinder unter 2 Jahren geeignet.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Vincerel anwenden.

Anwendung von Vincerel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Bislang sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Anwendung von Vincerel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Soweit bekannt, kann dieses Arzneimittel zusammen mit Speisen und Getränken eingenommen werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine Angaben über die Wirkung von Vincerel auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Stillen vor. Es ist kein Einfluss auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaft oder Stillen zu erwarten, angesichts der homöopathischen Verdünnungen der Bestandteile dieses Arzneimittels, die sich bisher nicht als toxisch erwiesen haben. Soweit bekannt, kann Vincerel während der Schwangerschaft und der Stillzeit in der empfohlenen Dosierung eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Informationen bekannt, die darauf hinweisen, dass Vincerel die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt.

Vincerel enthält Ethanol

Dieses Arzneimittel enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol), weniger als 100 mg pro Dosis.

3. Wie ist Vincerel Spray zur Anwendung in der Mundhöhle anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung für Erwachsene:

Die empfohlene Dosis beträgt 1 Sprühstoß, 3 bis 5 mal täglich. Bei akuten Beschwerden, 1 Sprühstoß alle halbe bis eine Stunde anwenden und danach zur üblichen Dosis übergehen (maximum 12 Sprühstöße täglich).

Dosierung für Kinder:

Kinder und Jugendliche von 2 bis 18 Jahren

Die empfohlene Dosis beträgt 1 Sprühstoß, 3 bis 5 mal täglich. Bei akuten Beschwerden, 1 Sprühstoß alle halbe bis eine Stunde

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/40

B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Vincerel solution pour pulvérisation buccale ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. A conserver dans l'emballage d'origine.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Vincerel?

Les substances actives de 100 g de solution sont : Apis mellifica D7, Belladonna D5, Calendula officinalis D3, Echinacea purpurea D5, Phytolacca decandra D3, Plantago major D3, Salvia officinalis D3, Vincetoxicum officinale D5 à 1,25 g. Les autres composants (excipients) sont: Ethanolum, Aqua purificata, Glycerolum.

Qu'est-ce que Vincerel et contenu de l'emballage

Solution pour pulvérisation buccale.

Flacon avec pompe doseuse contenant 20 ml.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium nv

B-9031 Drogen (Gent)

Tél.: 09/265 95 65

Fax: 09/223 00 76

E-mail: info@heel.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché


982 CH 689 F11

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est septembre 2015.

anwenden und danach zur üblichen Dosis übergehen (maximum 12 Sprühstöße täglich).



Drehen Sie das Mundstück in eine horizontale Position.

Drücken Sie den Sprühkopf vor der ersten Verwendung von Vincerel solange, bis ein feiner Sprühnebel entsteht. Legen Sie den Zeigefinger auf den Sprühkopf. Führen Sie das Mundstück in den Mund, richten Sie es auf die betroffene Stelle und drücken Sie den Sprühkopf. Die Flasche sollte möglichst vertikal gehalten werden.

Eltern sollten ihre Kinder zwischen 2 und 11 Jahren anleiten, das Spray während dem Sprühen nicht inhalieren.

Aus hygienischen Gründen ist es nicht empfehlenswert, dasselbe Produkt mit anderen zu teilen.

Wenn Sie eine größere Menge von Vincerel angewendet haben, als Sie sollten

Laut der Homöopathie steht die Wirkung mehr mit dem Verdünnungsgrad als mit der Dosierung im Zusammenhang. Wenn Sie von Vincerel mehr als die empfohlene Dosis angewendet haben, wird die Wirkung dadurch nicht verstärkt. Wenn mehr Vincerel angewendet wurde als unbedingt erforderlich ist, sind in der Regel keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Wenn Sie noch Fragen haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Antgiftzentrum (070/245.245) auf.

Wenn Sie die Anwendung von Vincerel vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Vincerel abbrechen

Es sind keine Wirkungen nach dem Absetzen der Behandlung zu erwarten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen oder lokale allergische Reaktionen (Hautentzündung, Rötung, Schwellung und Juckreiz) entstehen. In diesem Fall sollte die Anwendung des Produktes nicht fortgeführt werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/40

B-1060 BRUSSEL

Website: www.fagg-afmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Vincerel Spray zur Anwendung in der Mundhöhle aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. In der Originalverpackung aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Flasche und dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier nächsten das Jahr. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Es trägt damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Vincerel enthält

Die Wirkstoffe in 100 g Lösung sind: Apis mellifica D7, Belladonna D5, Calendula officinalis D3, Echinacea purpurea D5, Phytolacca decandra D3, Plantago major D3, Salvia officinalis D3, Vincetoxicum officinale D5 à 1,25 g. Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanolum, Aqua purificata, Glycerolum.

Wie Vincerel aussieht und Inhalt der Packung

Spray zur Anwendung in der Mundhöhle.

Flasche von 20 ml mit einer Dosierpumpe.

Pharmazeutische Unternehmer und Hersteller

Heel Belgium nv

B-9031 Drogen (Gent)

Tel.: 09/265 95 65

Fax: 09/223 00 76

E-mail: info@heel.be

Zulassungsnummer

982 CH 689 F11

Abgabestatus

Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2015.